

## گزارش تحلیلی مزارع گندم استان گلستان.

تاریخ ارسال گزارش استانی ۸۶/۱/۲۸

بر اساس گزارشات ارسالی از استان گلستان در اسفندماه سال زراعی جاری کلیه مزارع گندم استان از مرحله پنجه زنی خارج و و وارد مرحله ساقه دهی و تا پایان فروردین ماه می بایستی وارد مرحله بوتینگ گردند در حالیکه اکثر مزارع در مرحله ظهور برگ پرچم به سر می برند که علت تعویق در رشد گندم کاهش حداقل و حداکثر دما نسبت به سال گذشته (به ترتیب ۱/۵۵ و ۳/۸ درجه سانتیگراد) می باشد. مقایسه رطوبت نسبی تغییرات محسوسی نسبت به سال گذشته را نشان نداد و تنها میانگین حداقل آن نسبت به سال گذشته در حدود ۹٪ افزایش داشته است.

در سال زراعی جاری کود ازته در حد نیاز در اختیار کشاورزان استان قرار گرفته است و حدوداً در ۲ تا ۳ نوبت به مزارع داده شده است لیکن بارندگی های بهاره باعث آبهشویی ازت خاک شده و در برخی مزارع کمبود این ماده غذایی مشهود می باشد.

مقایسه آمار بارندگی نشان می دهد علیرغم کاهش تعداد روزهای بارانی ، میزان بارندگی کلیه ایستگاه های سینوپتیک استان، حدوداً به بیش از ۲ برابر سال گذشته رسیده است.

با توجه به بارندگی های مداوم و ابری بودن هوا بیماری سفیدک سطحی گسترش زیادی پیدا کرده است و در خصوص بیماری زنگ زرد بر روی ارقام کوهدشت و تجن خوشبختانه به سبب سردی هوا گسترش قابل توجهی نداشته است. سایر بیماری ها از قبیل انواع لکه برگی ها، زردی برگ های پایین و در موارد معدود فوزاریوم برگی دیده شده است که در حال حاضر توسعه چندانی ندارد.

به هر حال قضاوت در خصوص گسترش بیماری های گندم در استان زود می باشد زیرا تجربه نشان داده است که عمده توسعه بیماری های غلات در این استان بعد از ظهور خوشه انجام می شود و جهت مبارزه با بیماری های قارچی احتمالی مقدار ۸۰ هزار لیتر قارچ کش در مناطق پر خطر در اختیار کشاورزان قرار گرفته تا در صورت شیوع، اقدام به مبارزه شیمیایی صورت پذیرد.